8ème année n° 33 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

AVEYRON, AUDE. GARD. HÉRAULT, LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES

MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72 - C. C. P. 52 38 57

AVERTISSEMENTS

2ème Edition nº I2

3ème, 4ème, 5ème Editions nº IO

23 Juillet I960

CARPOCAPSE

Zones II, III, IV, V, VI

Renouveler le traitement conseillé le 6 juillet.

TAVELURE

Zones II, III, IV, V, VI

début du

A la suite des pluies tombées depuis le/mois de juillet, il est nécessaire d'exécuter un nouveau traitement.

INFORMATIONS

TORDEUSE

Zones II, IV

Commencer les traitements sur les fruits devant être récoltés dans la période du 15 Août.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Zones II, III, IV, V, VI

(sauf Aveyron)

Les orages récents et des rosées favorisent les attaques de Mildiou.

Un traitement urgent est indispensable.

La destruction des fanes, pour les variétés précoces qui arrivent à maturité, est à effectuer par fauchage ou par application d'un colorant (dinitrocrésol).

L'arrachage des tubercules sera effectué quelques jours plus tard par temps sec.

TEIGNE DU POIREAU

Zones II, III, IV, V, VI

Des dégâts importants sont observés, Appliquer périodiquement un insecticide à base de D.D.T. ou de Parathion.

SEPTORIOSE DU CELERI

Zones II, III, IV, V, VI

Appliquer périodiquement un anticryptogamique cuprique ou un organo-cuprique ou un organo-cuprique ou un organique

PIERIDE DU CHOU - PUNAISE Zones II, III, IV, V, VI

Dans les cultures où l'on observera l'apparition de jeunes chemilles ou larves, traiter avec un produit à base de D.D.T., Parathion, Roténone.

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

L.L.TROUILLON

P.BERVILLE 7